


Use el Método de Dos Pasos para matar las hormigas bravas.



Actualmente, el mejor sistema que ha comprobado controlar efectivamente las hormigas bravas se llama el Método de Dos Pasos, y ha sido promovido por el Servicio de Extensión Agrícola de Texas. Este método es más efectivo en áreas completamente infestadas (cinco o más hormigueros por cada 1/4 de acre de solar) o donde hay poco o ningún interés en conservar las especies de hormigas nativas.

El Método de Dos Pasos requiere que se esparza un insecticida de cebo en todo su solar, entre a fines de agosto y a mediados de octubre; y luego, que se traten los hormigueros problemáticos individualmente con insecticidas líquidos para saturarlos, insecticidas en polvo, de cebo o granulares, aprobados.

Primer paso: cebos

Los cebos de las hormigas bravas consisten de pesticidas en sémola de maíz procesada cubierta con aceite de soja. Las hormigas obreras transportan el cebo a la colonia donde se comparte con la reina. Después, ésta muere o se vuelve estéril. Los cebos que se pueden conseguir actualmente son, entre otros, Amdro, Siege, Logic, Award, Ascend, Extinguish, Distance and Spectracide Fire Ant Bait. Los cebos funcionan lentamente y se tardan semanas o meses en lograr un control entre el 80% y el 90%. Los productos de cebo se pueden usar para tratar fácil y eficazmente áreas grandes.

Contienen una cantidad sumamente baja de toxinas. Para obtener mejores resultados:

- Use un cebo fresco, de preferencia de un contenedor que nunca se haya abierto.
- Aplique el cebo cuando la tierra y el zacate estén secos y no se pronostique lluvia dentro de las próximas 24 a 48 horas.
- Aplique el cebo cuando las hormigas obreras estén buscando la comida activamente, generalmente al atardecer o por la noche. Para hacer la prueba, ponga un pequeño montón de cebo cerca de un hormiguero y observe si las hormigas lo encuentran dentro de 30 minutos.
- Aplique el cebo con esparcidoras de semilla manuales. No aplique el cebo revuelto con fertilizante o semilla.
- Los cebos se pueden aplicar en cualquier momento durante el tiempo de calor. Cuando se aplica a fines del verano o temprano en el otoño, las hormigas todavía andan buscando comida y es más fácil pronosticar los patrones del clima. Luego, el cebo puede surtir efecto durante el invierno mientras usted está adentro. Vuelva a aplicar el cebo una o dos veces al año.

Segundo paso: tratamiento individual de hormigueros

Productos químicos. Los productos en polvo no necesitan agua y, además, éstos actúan rápidamente. Sin embargo, dejan un residuo en la superficie de la tierra. Los líquidos para saturar por lo normal acaban con los hormigueros en unas horas y dejan muy poco residuo en la superficie después de la aplicación. Los productos granulares trabajan rápidamente y generalmente, se tienen que poner gránulos sobre el hormiguero y a su alrededor y luego, rociar de uno a dos galones de agua sobre el hormiguero. Siga detenidamente las instrucciones en la etiqueta.

Productos orgánicos. Si vacía de dos a tres galones de agua muy caliente o hirviendo en el hormiguero, mata a las hormigas como el 60 por ciento de las veces. Si no mueren, las hormigas probablemente se van a otro lugar. El agua muy caliente o hirviendo mata el zacate o la vegetación a los alrededores de donde se vacía. Otros métodos orgánicos o naturales son los productos líquidos para saturar que contienen ingredientes derivados de las plantas (por ejemplo, los insecticidas botánicos) y los agentes de control biológico.

Para más información, comuníquese con el agente de extensión de su condado o vea la página en Internet en <http://fireant.tamu.edu>.